

## Strategia Globală de eliminare a cancerului de col uterin a OMS

**Viziune: o lume în care cancerul de col uterin este eliminat ca problemă de sănătate publică;**

**Incidență de 4 la 100 000 femei;**

**Ținte: 90-70-90 până în 2030:**

**90% din fete complet vaccinate anti-HPV până la vârsta de 15 ani;**

90%

**70% testate prin screening cu teste de înaltă-performanță până la vârsta de 35 de ani și încă o dată până la 45 de ani;**

70%


**90% din femei diagnosticate cu leziuni precanceroase sau cancer de col uterin tratate la timp și corect.**

90%

## Incidență

**Este al 4-lea cel mai întâlnit cancer la femei**

**În fiecare an**



*Este provocat de anumite tulpini ale virusului papilloma uman (HPV), care provoacă cea mai frecventă infecție cu transmitere sexuală*

*Peste 120 de genotipuri de HPV identificate Dintre care 15 virusuri cu risc oncogenic înalt, care pot cauza cancer de col uterin*

Cele mai frecvente tipuri identificate în cazurile de cancer de col uterin: 16, 18, 31, 33, 35, 52, 58 sunt responsabile pentru aprox. 90% din cazuri

70%

90%

Tipurile 16 și 18 determină aprox. 70% din cancerele de col uterin

8 din 10 femei active sexual vor fi infectate cu HPV la un moment dat pe parcursul vieții

80% din infecțiile cu HPV se vindecă de la sine, fără să existe semne ale infecției

**Infecția persistentă cu HPV este cea care produce leziuni ale colului uterin cu potențial de evoluție malignă**

## Metode de prevenire a cancerului de col uterin

### Testare regulată

- ▲ Femeile de 25-64 ani - o dată la 5 ani
- ▲ Femeile 25-29 ani - test Babeș-Nicolaou
- ▲ Femeile 30-64 ani - test HPV, urmat de triaj citologic
- ▲ Test simplu, nedureros
- ▲ Depistează leziuni ale colului uterin care monitorizate și tratate corect pot preveni evoluția către cancer de col uterin.
- ▲ Cancerul de col uterin depistat în stadii incipiente se poate trata și vindeca cu recuperare totală.
- ▲ 49% din totalul cazurilor posibile de cancer au fost prevenite prin participarea regulată în programele organizate de screening.

### Vaccinare

Vaccinarea fetițelor în vârstă de peste 10 ani, înainte de începerea vieții sexuale și la un moment la care răspunsul imun este optim, poate scădea cu până la 30% riscul de cancer de col uterin, la o rată de vaccinare de 70%.

## Cancerul de col uterin în România

Anual, 3.380 de cazuri noi (11% din totalul cazurilor noi din UE)

Incidență de 2,5 ori mai mare decât media UE-27 (32,3 la 100.000 de femei față de 12,8 la 100.000 de femei)

1.805 decese